



# INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL

OFICINA DE PRENSA

## Nota de Prensa

**Director del IML afirma:**

### **“Muertes por suicidio en Nicaragua la más baja de la región”**

- Según estadísticas del IML

Escrito por: Lic. Herenia García Arias

[hgarcia@poderjudicial.gob.ni](mailto:hgarcia@poderjudicial.gob.ni)

[prensaiml@poderjudicial.gob.ni](mailto:prensaiml@poderjudicial.gob.ni)



“Las muertes por suicidio en Nicaragua, son muy pocas en comparación con el resto de los otros países de la Región”, informó el doctor Zacarías Duarte Castellón, director del Instituto de Medicina Legal (IML).

Según datos estadísticos, el IML realiza alrededor de 1,700 estudios post mortem a nivel nacional, al año por muertes violentas.

De ese total, en el 2012 se registraron a nivel nacional 148 muertes por suicidio, en el 2013 aumentó a 173 y en lo que va del 2014 solamente se han registrado 75 suicidios, dando como resultado el 8 por ciento del total, “Siendo una cifra baja. Claro que todas las muertes

violentas es preocupante y se deben de tomar medidas al respecto, siendo necesario disminuirlas.”, dijo el doctor Duarte.

El funcionario explicó que la organización Mundial de la Salud (OMS), establece que una tasa es elevada cuando es de 10 por ciento por 100 mil habitantes y que en Nicaragua es de 2.8 por ciento por 100 mil habitantes, “Siendo esta tasa, bajísima”, manifestó Duarte.

La tasa es lo que permite, determinar la gravedad de un problema desde el punto de vista de la salud pública o epidemiológico. Por lo tanto la tasa de suicidio en Nicaragua indica que la mortalidad por esta causa no representa un problema grave.

**Ambos sexos se suicidan por igual**

El doctor Zacarías Duarte, aseguró que tanto varones como mujeres son afectados por la mortalidad por suicidio.

Explicó que los mecanismos más comunes y usados por éstas personas para suicidarse en Nicaragua son ahorcamiento y heridas por arma de fuego.